Grenouille rousse *Rana temporaria*

Quelques indications pour détecter sa présence

(réalisation : Régis Morel – janvier 2009)

Photo Michel Riou

Un **adulte** de grenouille rousse

pupille horizontale
tache temporale incluant le tympan
yeux en position latérale

museau court et obtus
bourrelets dorso-latéraux convergents

tubercule métatarsien triangulaire
ventre le + souvent tacheté
talon n'atteignant pas le museau
iris de teinte claire

(d'après clé d'identification de F. Paysant)

Photo Régis Morel

Un site de ponte dans un **boisement marécageux de fond de vallée**

Photo Régis Morel

Un site de ponte en **queue d'étang boisée**

Photo Régis Morel

Des pontes déposées dans une **prairie inondée**

Photo Régis Morel

Un site de ponte forestier, dans une **dépression inondée plus ou moins marécageuse**

Sur un site de frai, les pontes sont habituellement concentrées au même endroit. Sur les sites importants, l**es amas de ponte peuvent couvrir une surface de plusieurs m²** comme sur cette photo (on distingue en second plan au bord de la mare plusieurs m² de pontes)

Photo Régis Morel

Un zoom sur un amas de pontes, dans une dépression faiblement inondée

Dans notre région, les pontes sont déposées en **janvier-février**

Chaque ponte (**de la taille d'un poing** lorsqu'elle est fraîche) est composée de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'oeufs

Elles reposent généralement dans une **faible profondeur d'eau** (une vingtaine de cm maxi)